

# SANÉQUI® COLON

**Voor hoefbevangenheid en dikke darm koliek.** Sanéqui Colon is zeer geschikt voor paarden die al verschillende malen koliek hebben gehad door gasophoping in de dikke darm en voor paarden met chronische hoefbevangenheid. Beide aandoeningen zijn het gevolg van een verstoring in de darmflora van de blinde en dikke darm. Slecht verteerde mest of teveel water bij de mest zijn meestal ook symptomen van gestoorde blinde en dikke darmfermentatie. Ook hier zal Sanéqui Colon verbetering brengen.

**Voor stabiele en gezonde blinde en dikke darmfermentatie.** Een gezonde blinde en dikke darmfermentatie is essentieel voor de gezondheid van een paard. De uitgekiende combinatie van vezels in Sanéqui Colon stimuleert een gezonde darmflora, als voedingsbron voor verschillende bacteriën. De levende gistcellen bevorderen de groei van vezelafbrekende bacteriën en helpen zo de verzuring van de darminhoud te voorkomen. Als de darminhoud te zuur wordt, sterven de "goede" bacteriën als eerste af. Het lage eiwit- en zetmeelgehalte en de voorbehandelde (ontsloten) zetmeelbronnen zorgen dat de dunne darm deze efficiënt verteert, zodat ze niet doorstromen naar blinde en dikke darm. Een rantsoen met Sanéqui Colon is zorgvuldig samengesteld en levert alle noodzakelijke voedingsstoffen, met ruime aandacht voor mineralen en vitaminen die de hoefkwaliteit verbeteren en het herstel na ziekte bevorderen. U voert het met grofstengelig hooi of kuil.

**Ook bij insuline resistentie en maagzweren.** Sanéqui Colon is een vezelrijk voer en heeft een laag zetmeel- en suikergehalte. Dit maakt het ook uitstekend geschikt voor paarden met insuline resistentie en paarden met maagzweren. Uw dierenarts kent de eigenschappen van de Sanéqui voeders en kan ze ook voorschrijven voor indicaties die niet in de brochures staan.

Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. Alle Sanéqui voeders zijn geschikt voor levenslang gebruik.

Alleen verkrijgbaar bij de dierenarts:

# SANÉQUI® COLON

**Speciaalvoeder voor paarden** die al verschillende malen koliek hebben gehad, veroorzaakt door gasophoping in de dikke darm.



**Ingrediënten:** Havermoutpellets, gerstvlokken (ontsloten), luzerne, appelpulp, tarwezemelen, lijnzaadolie, johannesbrood, sojabonen getoast, vitaminen en mineralen premix, lijnzaad geëxtrudeerd, wortelvlokken, tarwegries, gist.  
**Gehalten:** Ruw eiwit 10%, Ruw vet 8,6%, Ruwe celstof 16,2%, Ruwe as 7,8%, Calcium 1%, Fosfor 0,9%, VREp 6,5%. Toegevoegd per kg: Vitamine A: 10.440 IE, Vitamine D3: 1.560 IE, Vitamine E (alpha-tocopherolacetaat): 300 mg, Koper (Cu-II-sulfaat pentahydraat): 32 mg, Biotine: 528 mcg, Zink (Zn-II-sulfaat) 172 mg.  
**Voeradvies:** zie achterkant verpakking.  
**Meer informatie:** [www.sanequi.com](http://www.sanequi.com)

[www.sanequi.com](http://www.sanequi.com)

# Zó voer je Colon

Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: ..... Gewicht!:

Begeleidend dierenarts: .....

Volgende afspraak: .....

<sup>1</sup> **Gewicht van het paard:** het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel het uitgangspunt voor het voerschema.

## Rantsoen (datum: .....)

	Sanéqui Colon	Hooi (1)	Kuil (2)	Weidegang (3)
Uw paard/pony: .....	kg	kg	kg	uur

Voer dagelijks minimaal 4 porties hooi en 2 porties Sanéqui Colon (Sanéqui Colon en hooi mag tegelijk). Zorg dat uw dier nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.

## Rekenwijzer rantsoensamenstelling met hooi (basis):

Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en bereken de dagelijkse voergift. Zie de omrekeningstabel, als u in plaats van hooi, kuil of gras wil voeren.

Gewicht paard	Werkniveau <sup>2</sup>	Per 100 kg lichaamsgewicht		Uw paard/pony:	
		Sanéqui Colon	Grofstengelig-fris hooi	Sanéqui Colon	Hooi
< 250 kg	rust	480 g	1,3 kg	.....	.....
	licht	500 g	1,7 kg		
	matig	600 g	1,9 kg		
	zwaar	700 g	2,0 kg		
250-450 kg	rust	400 g	1,2 kg	.....	.....
	licht	500 g	1,5 kg		
	matig	550 g	1,7 kg		
	zwaar	600 g	1,7 kg		
	zeer zwaar	900 g	2,0 kg		
> 450 kg	rust	350 g	1,1 kg	.....	.....
	licht	450 g	1,4 kg		
	matig	500 g	1,5 kg		
	zwaar	550 g	1,6 kg		
	zeer zwaar	750 g	2,0 kg		

<sup>2</sup> Schat het gemiddelde werkniveau per week, dus inclusief rustdagen!

**Disclaimer:** Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.

## Gras of kuilvoer:

Begin altijd met een rantsoen met hooi, dus geen kuil of gras. Als de klachten duidelijk verbeterd zijn, mag u gras of kuilvoer voorzichtig in het rantsoen introduceren, uitgewisseld tegen hooi (zie omrekeningstabel). Het ruwvoer van paarden met verstoring van de darmflora, chronische hoefbevangenheid en/of insuline resistentie moet altijd voor minimaal 50% uit hooi bestaan (op droge stofbasis). Alleen voor paarden met maagzweren mag het ruwvoer voor 100% uit gras bestaan.

## Hoeveel kg kuil vervangt 1 kg hooi?:

Drogestofgehalte kuil:	60%	70%	75%
	behoorlijk natte paardenkuil	paardenkuil	droge paardenkuil
1 kg hooi wordt:	1,4 kg kuil	1,2 kg kuil	1,1 kg kuil

## Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):

	1 uur weidegang		2 uur weidegang		3 uur weidegang	
	rust	werk	rust	werk	rust	werk
Kleine pony	45%	35%	–	–	–	–
Grote pony	30%	25%	–	50%	–	–
Paard	20%	15%	40%	30%	–	50%

## Overgangsschema huidig voer naar Sanéqui Colon:

	Huidig rantsoen	Week 1	Week 2	Week 3 (Nieuw rantsoen)
Huidig krachtvoer	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen)	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
.....	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
.....	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
Sanéqui Colon	–	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: .....
Grofstengelig en fris hooi	–	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: .....

## Extra informatie:

- Geef uw paard een zoutblok in zijn stal.
- Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
- Weeg Sanéqui in een voerschip op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschip de hoeveelheid van één portie.
- Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personenweegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe partij hooi, nieuwe voerder.
- Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. **Houdbaarheid:** tot 6 maanden na productiedatum (zie verpakking). **Bewaarcondities:** koel en droog.